Precauciones al Tomar Espironolactona

La preocupación más importante al tomar espironolactona es la prevención del embarazo. Los pacientes no deben quedar embarazadas mientras estén tomando espironolactona debido a su asociación con la feminización de fetos masculinos y el desarrollo de anomalías renales fetales.

La espironolactona puede estar asociada con la plenitud de seno y períodos irregulares. En un estudio en gran medida refutado, se observó que el cáncer de mama aumenta el riesgo de cáncer de mama en los seres humanos, pero de nuevo, este estudio no fue concluyente.

La espironolactona puede disminuir ligeramente la presión arterial. Tenga en cuenta los mareos potenciales, especialmente cuando se levante desde una posición sentada.

La espironolactona puede estar asociada con hiperpotasemia (niveles altos de potasio), especialmente en pacientes con enfermedad renal. Por favor, no tome suplementos de potasio mientras esté en espironolactona. Si experimenta alguna debilidad muscular o parálisis, por favor detenga el medicamento.

Además, interrumpa el medicamento si está enfermo con una infección bacteriana o viral. Espironolactona es conocido por interactuar con el antibiótico Bactrim y Ciprofloxacino. Hágale saber a su médico que no puede tomar Bactrim o Ciprofloxacino (Cipro). Los nombres alternativos para Bactrim se enumeran a continuación:

- Bactrim
- Bactrim DS
- Co-trimoxazole
- Septra
- Sulfamethoprim
- Sulfamehtoprim-DS
- Sulfametoxazole-trimethoprim (SMX-TMP)
- Sulfatrim
- Trimethoprim-sulfamethoxazol (TMP-SMX)

El tratamiento del acné es un uso fuera de etiqueta para este medicamento